

脱贫致富的“领头雁”

——记交城县庞泉沟镇苏家湾村支部书记杨继生

□ 郭 晋

打赢脱贫攻坚战,关键在人。一名党员干部,就是一面旗帜。在脱贫攻坚的战役中,作为一名党员就要举好这面旗,带头发扬“不怕困难、艰苦奋斗、攻坚克难、永不退缩”的精神和先锋模范作用,才能带领群众脱贫致富。

苏家湾村位于交城县庞泉沟镇以南8公里处,由苏家湾和梅窑会两个自然村组成。近年来,苏家湾村党支部书记兼村委主任杨继生带领全村父老乡亲,围绕党的路线、方针、政策,高效利用当地得天独厚的自然条件,发挥基层党组织的战斗堡垒作用,在肉牛养殖、中药材种植、苗木栽培、旅游开发等方面进行了大胆尝试和创新,走科学致富、集体致富的道路,使全村各项事业取得了明显进步,2016年,苏家湾村顺利通过脱贫验收,实现了整村退出摘帽。2017年,村支书杨继生本人被中共吕梁市委授予“五一劳动奖章”称号,被省委组织部评为全省优秀共产党员。

抓党建,锻造战斗堡垒

在 习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章
弘扬吕梁精神 攻坚深度贫困

快过党的生日了,村里忙前忙后张罗着。郭香兰隔三差五就往村委会院子里跑,不是擦洗玻璃,就是清理院落,她说:“老了,不中用了,趁我还能走动着,给咱党支部、村委会做点力所能及的小事,让咱们窗明几净迎接党的生日!”

71岁的郭香兰是方山县马坊镇里其村的一名老党员。18岁加入中国共产党后,一直从事农村妇女工作,担任村妇联主任43年。近年来,由于家境的变化,郭香兰无奈离开了她热爱一生的妇女工作岗位。但她离而不休,奉献不止,时刻关注村里的发展变化,发挥余热。2016年冬天,村里有5个享受低保政策的指标,而符合条件的村民有十几户,其中就包括郭香兰一家。在全体党员和村民代表会议上,经过严格公正的层层把关,最终有6户成为确定对象。怎么办呢?5和6只差一个,下谁呢,这6户都相当困难,令人难以抉择。这时,村干部提议让在场的12名党员投票决定,谁的票最少就下谁。不多一会儿,结果出来了,6户群众有5户都是12票,唯有郭香兰是11票。大家感到非常奇怪,按困难程度,按年龄大小,按人品人性,郭香兰都应该是没有问题的。现场看票,发现身为党员的郭香兰自己为自己少投了一票。

6月18日,笔者在里其村见到了这位老党员,谈起低保投票一事时,郭香兰说:“村民们都很困难,都符合条件,我身为共产党员,我不主动退出,谁退出我心里都不好受,况且共产党员就应该舍小家为大家,就应该关键时刻发挥作用,就应该顾全大局,所以当时我就想自己少投一票,这个事就圆满的解决了。”朴实的话语,表达的是一位农村老党员对党的忠诚,体现的是一位农村老党员的党性觉悟。



方山县峪口镇张家塔村核桃产业发展飞快,该县林业局精准扶贫跟踪服务,春剪夏施肥。现在又到了核桃树嫁接的季节,近日,该县林业局从核桃产区——汾阳市聘来了十多个嫁接技术员,带着优良核桃接穗,免费为果农们对一些劣质品种的核桃树进行嫁接改良。新品种早挂果、结果稠、皮薄且块头大、营养高。这一改良,使张家塔核桃产业再上一个新的台阶。

闫志宏 赵玉润 摄

“土豆王”的脱贫经

——岚县河口乡王家村建档立卡贫困户康建福脱贫事迹

□ 张岳巍

发展“土豆-土豆专业合作社-土豆花观赏-土豆农家乐-土豆贮藏增值”循环产业,年产值达到30万元,年纯收入超过10万元……近日,笔者到河口乡王家村采访时,脱贫致富户康建福如此介绍他的脱贫经。

康建福曾是王家村建档立卡贫困户,他依靠勤劳双手脱贫摘帽,创业致富,并成为当地远近闻名的“土豆大王”、致富能手、脱贫典型、党员创业示范户。

立足本地实际 发展土豆产业

1980年,康建福高中毕业后即回到家中务农。他先后养过猪、打过工、造过林,最后当上村里的会计。即使十八般武艺全用上,也只能勉强维持温饱。后因结婚还背上了几千元的债务。

穷则思变。王家村地处高寒山区,气候凉爽,昼夜温差大,土壤含钾高,种植土豆具有得天独厚的优势。他想,只有立足本地实际,发展土豆产业,才有可能找到一条脱贫致富之路。为此,2005年,康建福承包村里外

亩,都是统一规划、统一管理、统一生产、统一销售,目前年产量能达到1500多万斤。“康建福自豪地介绍道。“我2014年当年种植土豆40多亩,平均亩产4000斤左右,总产达到16万斤,仅土豆一项就收入9万余元,人均纯收入达到1.2万元。当年就甩掉了贫困帽。”

在康建福的倡导下,2016年合作社争取“一县一业”扶贫资金15万元,建起了260平米的薯窖3孔,能贮藏土豆300多吨。为社员、贫困户免费存放土豆。当年,加入合作社的36户贫困户依托合作社全部脱贫。合作社因此获得“省级农民专业合作社示范社”“中国马铃薯示范基地”“合作经济创新奖”“优秀农民专业合作社”等称号。

依托“土豆花开” 打造农家品牌

2015年7月,岚县举办了首届“土豆花开了”旅游文化月活动,作为主场地河口乡王家村更是人山人海,人们赏花、观景、看戏、品食,登高乘凉,消夏避暑,外来人员络绎不绝。善于捕捉商机的康建福正好看中城里人喜爱绿色、原生态自然风光及岚县土豆风味美食的特点,率先响应县乡号召,在自家办起了以土豆为主要食材的农家乐,当年接待游客300余人次,收入8000余元。

2016年,随着“土豆花开了”旅游文化的

旅游板块,以村集体成立了骨节山旅游开发有限公司,以每股5000元吸纳参股村民90户,聘请旅游开发公司统一规划,全力推进苏家湾村营房沟综合开发,目前已初步建设成为集森林穿越、水上拓展、山地摩托、露营服务等为一体的综合性森林休闲康养基地,2017年实现收入50万元,解决贫困户就业35人,人均岗位工资达4000元。

故土情,树立为民形象

“心底无私天地宽”,这是他经常挂在嘴边的一句话。从企业家成功转型为一名农村带头人,支撑他的是对故土的深深眷恋,是“全心全意为人民服务”的初心。以村为家,出力流汗,他从来不计报酬、不求回报。上任伊始,恰逢县里开展低保核查,杨继生主动提出取消自己母亲的低保待遇,理由是自己是支部书记,应该带这个头;村里一些年老体弱贫困户因丧失劳动能力,交不起农村合作医疗个人缴费部分,他自掏腰包足额补齐;苏家湾村距县城85公里,往返县城项目、开会办事产生的油钱等费用,他全部个人承担,招待外来客商也都安排在自己家里,从未向村里报过一张条子,坚决不给集体增添一分钱负担,他以自己的行动表达了对家乡深深的爱,诠释了一名党员“忠诚担当”的崇高品质。



好葡萄是这样管出来的

当前葡萄正在旺盛生长,即将进入果实膨大期,逐渐趋向成熟,在采收前一个月是获得优质高产的关键期,要获得好收成,就得抓好肥水管理及病害防治工作。

肥水管理不务虚

及时施肥,补给养分。一般于果实着色初期追肥一次,以磷钾肥为主。可选择硫酸钾三元复合肥进行土施;也可以通过根外追肥的方式,结合防治病虫害一起喷施,增加叶片和果实营养,可选用0.5%-1%磷酸二氢钾溶液等连喷2-3次。

为提高葡萄浆果的耐贮藏性,可在采收前一个月,连续喷施两次钙素叶面肥(如钙宝1000-1200倍),可以明显提高葡萄浆果中钙的含量,从而提高葡萄品质及耐贮藏性,对预防裂果也有一定的作用。

加强水分管理。为了保证葡萄品质,要求在采收前一个月内严格控制灌水,防止品质降低。

病害防治要抓紧

葡萄从果实膨大期至成熟期容易发生诸如霜霉病、黑痘病、炭疽病、白腐病等病害。在抓好田间肥水管理的同时,必须及时做好各种病害的防治工作。

1、霜霉病:一般6~7月发生最为严重。在发病前或发生初期,选用78%科博或80%必备可湿性粉剂500~600倍或27.12%铜高尚悬浮剂500倍进行预防,可同时预防黑痘病、炭疽病、白腐病的发生;在发病中后期,可选用60%灭克可湿性粉剂600倍或72%霜脲锰锌可湿性粉剂500倍或72%克露可湿性粉剂600倍或58%雷多米尔可湿性粉剂500倍等药进行防治。

2、黑痘病、炭疽病:高温高湿条件容易发生,预防葡萄从果实膨大期至成熟期容易发生诸如霜霉病、黑痘病、炭疽病、白腐病等病害。在抓好田间肥水管理的同时,必须及时做好各种病害的防治工作。

3、遮阳网管理。越夏覆盖遮阳网的目的是合理调控温室的温度和光照,如果温度降下来了,但是光照减少,那么照棚会造成危害。大棚遮阳网密度不宜过大,阴天要及时撤除,遮光时间过长植株制造的

越夏西红柿空洞果咋防

西红柿果实主要发生在深冬以及越夏、秋延迟栽培过程中,是严重影响西红柿产值的一种生理病害,但是这种危害是可以避免的,在此将预防措施介绍如下,供参考:

一、不要随便长时间冲施激素肥料。激素肥料能使西红柿形成大量的空洞果。二、加强养分供应。越夏西红柿营养生长旺盛,再加上菜农朋友激素点花,就非常容易导致营养生长和生殖生长失调。所以要适当补充钾肥,促进果实发育。

三、遮阳网管理。越夏覆盖遮阳网的目的是合理调控温室的温度和光照,如果温度降下来了,但是光照减少,那么照棚会造成危害。大棚遮阳网密度不宜过大,阴天要及时撤除,遮光时间过长植株制造的

小黄瓜底部叶片应该咋处理

小黄瓜生产中,总会听到这样的疑问,摘不摘下部老叶?是先摘叶再落蔓还是先落蔓再摘叶?笔者认为,下部老叶一定要摘除,先摘叶再落蔓,这样效果才好。

摘除老叶好处多

地膜有用,但作用有限。棚内铺设地膜对于降低湿度有一定的作用,但黄瓜茎蔓下部贴近地面处仍是湿气的聚积地,下部老叶染病更易,且会逐步向上感染,造成更大的为害,菜农用于防治病害所花费用肯定多于雇工的劳务费用,省钱一说无从谈起。

植株衰弱,产量低。老叶病叶会消耗植株营养,菜农都了解,但菜农往往忽视病叶上的病菌,它们也会消耗植株自身大量的养分,因此患病植株的衰败程度是

非常快的,这就需要引起菜农重视,及时摘除老叶、病叶。

药剂可参考霜霉病的防治。病害发生后,可选用68.75%易保水分散粒剂800~1000倍或43%好力克悬浮剂3000~5000倍或12.5%力克菌可湿性粉剂1500倍等药剂进行防治。

3、白腐病:6月初始发,如遇7~8月雨水多、台风多则发病加重,特别是果实进入着色至成熟期,感病程度明显增加。预防药剂可参考霜霉病的防治,治疗药剂可参考黑痘病的防治。

4、白粉病:高温干旱天气有利于该病害的发生和流行,以6~7月发生较为严重,生长期后期发病较少。药剂防治可选择43%好力克悬浮剂3000~5000倍或10%世高水分散粒剂1500倍等进行防治。

5、灰霉病:果实着色至成熟期若天气湿热,常导致果穗严重发病,特别是设施栽培要重点加以防治。药剂可选用50%扑海因悬浮剂1000倍(预防)或40%施佳乐800~1000倍或50%农利灵水分散粒剂1000倍等,交替用药。

6、水罐子病:是葡萄果实的生理性病害,又称葡萄转色病。葡萄水罐子病表现为果粒色泽不正常,色淡,白色品种果粒呈水泡状,有色品种果粒变成水红色,果粒变软,成一包酸水,极易脱落,此病多发生在穗尖,结果枝留两穗果的比一穗果的发病多,地下水位高或果实快成熟时遇高温多雨,发病较重。

预防方法:①留足叶片,每穗至少15~18片叶(夏稍每两叶摘心);②田间雨天及时排水,久晴要沟灌浅水;③基施复合肥和钾肥;④多施含磷、钾的有机肥料,如鸡鸭粪、草木灰等农家肥,增加叶片和果实的含钾量;⑤加强夏季修剪,合理负载;⑥地下水位高的地块要及时开沟排水。

郭友 宗禾

