3月25日起,我省公立医疗机构开展新冠病毒抗原检测项目

抗原检测总费用不超过15元/人次

3月17日,省医保局传来消息,《关于新增新型冠状病毒抗原检测项目价格的通知》印发,自3月25日起,我省公立医疗机构开展新冠病毒抗原检测项目,检测总费用不得超过15元/人次,其中检测服务费用5元/人次,抗原检测试剂(含采样器具)零差率销售。

我省明确,公立医疗机构针对不以疾病

诊疗为目的的新冠病毒抗原检测,不得收取门诊诊察费(含方便门诊和基层卫生服务机构收取的一般诊疗费);患者自测的,公立医疗机构不得收取“新型冠状病毒抗原检测”项目的检测服务费用;第三方检测机构提供抗原检测服务,定价应当遵循“公平、合法和诚实信用”原则,体现保本微利。

据了解,我省医保部门与山东省医保

部门联合开展了新冠病毒抗原检测试剂集中采购。3月16日已开标产生了中选结果,11家新冠病毒抗原检测试剂生产企业申报参加,5家企业入选,新冠病毒抗原检测试剂价格由市场平均价格30多元降至9元以下,最低价7.9元/人份,平均降幅74.7%,有效降低了新冠抗原检测试剂价格,减轻了民众检测费用负担。(武佳)

关于抗原检测 你想知道的都在这里

什么是抗原检测?做了抗原检测可以不用再做核酸检测了吗?什么地方可以买到抗原检测试剂?是每个人都可以做吗?自测的时候需要注意些什么……自从国家卫健委发布《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案(试行)的通知》以来,不少人发出这样的疑问。如今,山西抗原检测即将开始,针对广大民众普遍关注的热点问题,记者采访相关部门,为大家进行了详细梳理。

什么是抗原检测?

抗原检测是快速检测新冠抗原的一种方法,是在试纸条上标记抗新冠病毒蛋白的多克隆抗体,用来检测样本中新冠病毒抗原。

依据《新冠肺炎诊疗方案》第八版,目前针对新冠病毒,常用的实验室检测方法有:核酸检测、病毒全基因测序、抗体检测。

抗原检测推行后,防控新冠疫情,又多了一种检测手段。

与核酸检测相比,抗原检测有什么优势?

与核酸检测相比,抗原检测的优势有两点:

第一是方便,快速抗原检测在家里就可以做,不需要像核酸检测那样依赖复杂的仪器设备。

第二是快捷,核酸检测最快也需要4—6个小时,而抗原检测只需要10—20分钟就可以出结果,可谓立等可取。

抗原检测作为补充手段可以用于特定人群的筛查,有利于提高“早发现”能力。一直以来,抗原检测在很多国家,包括我国香港都在使用。增加抗原检测,在基层的医疗机构、社区卫生服务机构、乡村诊所甚至学校的医务室都可以开展。它操作比较简单,如果出现多点散发、聚集性疫情,通过抗原检测能够更快地发现感染者,更早期地采取隔离措施。

抗原自测结果能取代核酸结果吗?

《试行方案》规定,新冠确诊的金标准依然是核酸检测,抗原检测作为核酸检测的补充手段,自测结果不能取代核酸结果,如果抗原检测阳性,需要进行核酸检测确认。

抗原检测的准确性如何?

抗原检测在个体刚感染时可能测不出,但核酸检测就大概率可以测出。总体上,发病潜伏期和初期,抗原检测的阳性检出率明显低于核酸检测。专家表示,抗原检测的准确性和很多因素有关,比如产品质量、采样准确性等。如果不是严格按照说明书来采样操作,对检测结果影响还是比较大的。

抗原检测是什么人都可以做吗?

根据《试行方案》,抗原检测主要适用这三类人群:

一是到基层医疗卫生机构就诊,伴有呼吸道、发热等症状且出现症状5天以内的人员。基层医疗卫生机构接诊该类人员时,如具备核酸检测能力,应当首选进行核酸检测;不具备核酸检测能力的,进行抗原检测;

二是隔离观察人员,包括居家隔离观察、密接和次密接、入境隔离观察、封控区和管控区内的人员;

三是有抗原自我检测需求的社区居民。

做抗原自测时需要注意什么?

为确保采样检测质量,居民自测时,需认真阅读说明书,按照规定的要求和流程,规范地进行采样、加样、结果判读等操作。

抗原检测阳性的,不论是否有呼吸道、发热等症状,居民应当立即向所在社区(村镇)报告,由社区(村镇)联系急救中心按照新冠肺炎疫情相关人员转运工作指南,将居民转运至设置发热门诊的医疗机构,进行核酸检测。

抗原检测阴性的,无症状的居民可密切观察,需要时再进行抗原检测或核酸检测;有症状的居民,建议尽快前往设置发热门诊的医疗机构就诊,进行核酸检测;如不便就诊,则应当居家自我隔离,避免外出活动,连续5天每天进行一次抗原自测。

自己在家做抗原检测时该如何操作?

抗原自测共有三大步骤:

第一、抗原自测前准备。

1.洗手。使用流动清水或手部消毒液清洗双手。

2.了解检测流程。仔细阅读抗原自测试剂配套说明书及抗原自测相关注意事项。

3.试剂准备。检查抗原自测试剂是否在保质期内,检查鼻拭子、采样管、检测卡等内容物是否有缺失或破损。如试剂过期或试剂内容物缺失、破损应及时更换检测试剂。

4.确认检测对环境温湿度要求。胶体金试纸条检测一般要求在14℃至30℃常温条件下,避免过冷、过热或过度潮湿环境导致检测结果异常。抗原检测卡拆除包装后置于平坦、清洁处。

第二、样本采集。

1.年龄在14岁以上的,可自行进行鼻腔拭子采样。自检者先用卫生纸擤去鼻涕。小心拆开鼻拭子外包装,避免手部接触拭子头。随后头部微仰,一手执拭子尾部贴一侧鼻孔进入,沿下鼻道的底部向后缓缓深入1厘米至1.5厘米后贴鼻腔旋转至少4圈(停留时间不少于15秒),随后使用同一拭子对另一鼻腔重复相同操作。

2.年龄在2岁至14岁的自

检者应由其他成人代为采样。采样时,先用卫生纸擤去鼻涕,随后头部微仰。采样人员小心拆开鼻拭子外包装,手部避免接触拭子头,一手轻扶被采集人员的头部,一手执拭子贴一侧鼻孔进入,沿下鼻道的底部向后缓缓深入1厘米后贴鼻腔旋转至少4圈(停留时间不少于15秒),随后使用同一拭子对另一鼻腔重复相同操作。

第三、抗原检测。

1.根据试剂说明书,将采集样本后的鼻拭子立即置于采样管中,拭子头应在保存液中旋转混匀至少30秒,同时用手隔着采样管外壁挤压拭子头至少5次,确保样本充分洗脱于采样管中。

2.用手隔着采样管外壁将拭子头液体挤干后,将拭子弃去。采样管盖盖后,将液体垂直滴入检测卡样本孔中。

3.根据试剂说明书,等待一定时间后进行结果判读。阳性结果:“C”和“T”处均显示出红色或紫色条带,“T”处条带颜色可深可浅,均为阳性结果。阴性结果:“C”处显示出红色或紫色条带,“T”处未显示条带。无效结果:“C”处未显示出红色或紫色条带,无论“T”处是否显示条带。结果无效的,需重新取试剂条重测。

做完检测的废弃物该如何处理?

1.隔离观察人员:检测结果不论阴性还是阳性,所有使用后的采样拭子、采样管、检测卡等装入密封袋由管理人员参照医疗废物或按程序处理。

2.社区居民:检测结果阴性的,使用后的所有鼻拭子、采

样管、检测卡等装入密封袋后作为一般垃圾处理;检测结果阳性的,在人员转运时一并交由医疗机构按照医疗废物处理。

(薛琳)

本版稿件均据《山西晚报》